

安全に
使うための

けい し ぶく りょう がん

桂枝茯苓丸の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に桂枝茯苓丸を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- 月経不順、月経困難、月経痛
- 下腹部痛
- 月経に伴う精神不安、イライラなど
- 更年期障害
- 産後の体調不良や精神不安
- 肩こり
- めまい
- 頭重
- 打ち身
- しもやけ
- しみ
- 湿疹や皮膚炎
- にきび
- のぼせて足が冷える

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

平素の体力は虚弱ですか？

中等度／充実

虚弱



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

【参考事項】

- ・漢方の「瘀血（おけつ）」に対応する代表的な処方です。
- ・便秘がある場合は、桃核承気湯の確認票もご覧ください。

効能・効果

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症:月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの桂枝茯苓丸	ウチダ和漢薬	ケイブツクN「コタロー」	小太郎漢方製薬
オオクサ桂枝茯苓丸	大草薬品	阪本漢法の桂枝茯苓丸 300	阪本漢法製薬
紀伊国屋桂枝茯苓丸	紀伊国屋漢薬局	JPS桂枝茯苓丸料エキス錠N	ジェーピーエス製薬
「クラシエ」漢方桂枝茯苓丸料エキス錠	クラシエ薬品	錠剤 桂枝茯苓丸	一元製薬
桂枝茯苓丸料Aエキス細粒「分包」三和生薬	三和生薬	ツムラ漢方桂枝茯苓丸料エキス顆粒	ツムラ
桂枝茯苓丸料エキス顆粒KM-2	カーヤ	トチモトの桂枝茯苓丸料	栃本天海堂
桂枝茯苓丸料エキス〔細粒〕69	松浦薬業	花扇桂枝茯苓丸	小西製薬
桂枝茯苓丸ダイコー	大晃生薬	ホノミフックツEX錠	劑盛堂薬品
桂枝茯苓丸料エキス散〔勝昌〕	東洋薬行	本草桂枝茯苓丸料エキス顆粒-M	本草製薬
桂枝茯苓丸料エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業	モリ ビーシャン	大杉製薬
桂枝茯苓丸料「タキザワ」	タキザワ漢方廠	ワクナガ桂枝茯苓丸料エキス細粒	湧永製薬

使用上の注意 (平成 25 年 10 月現在)

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

桂皮、茯苓、牡丹皮、桃仁、芍薬

桂枝茯苓丸の体力分類に対する適応度 (服用される方の普通の体力でお考えください)

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	0	2	2	0

2:最適、1:適応可能、0:原則としては適さない