

安全に
使うための

りょう けい じゅつ かん とう
苓桂朮甘湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に苓桂朮甘湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

↓ いいえ

はい →

服用できません

□ 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？

□ 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？

□ 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」 →

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

↓ いいえ

はい →

次のような症状がありますか？

□ 立ちくらみ

□ めまい・ふらつき

□ 頭痛

□ 耳鳴り

□ 動悸・息切れ

□ 神経過敏

□ 神經症（発作性ののぼせや動悸）

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」 →

服用はおすすめできません*

□ 心臓に不具合はありますか？

□ 腎臓に不具合はありますか？

□ 血圧はひどく高いですか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」 →

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

↓ 中等度／虚弱

充実 →

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれません
が、あなたの意思により服用可能です

□ めまいやふらつきを感じことがありますか？

□ のぼせや動悸を感じことがありますか？

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」 →



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの苓桂朮甘湯エキス散	ウチダ和漢薬	本草苓桂朮甘湯エキス顆粒－M	本草製薬
「クラシ工」漢方苓桂朮甘湯エキス顆粒	クラシ工薬品	苓桂朮甘湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	三和生薬
JPS苓桂朮甘湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬	苓桂朮甘湯エキス顆粒KM-2	カーヤ
錠剤 苓桂朮甘湯	一元製薬	苓桂朮甘湯エキス〔細粒〕63	松浦薬業
ツムラ漢方苓桂朮甘湯エキス顆粒	ツムラ	苓桂朮甘湯エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業
天祐（エキス顆粒）	建林松鶴堂	苓桂朮甘湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠
トチモトの苓桂朮甘湯	栄本天海堂	レイジットN「コタロー」	小太郎漢方製薬
ホノミキジョウ錠	剤盛堂薬品	ワフナガ苓桂朮甘湯エキス細粒	湧永製薬

使用上の注意（平成26年6月現在）

してはいけないこと

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。 むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

茯苓、白朮または蒼朮、桂皮、甘草

苓桂朮甘湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	2	1	0	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない