

効能・効果

体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるものの次の諸症：関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの疎風定痛湯（分包）	ウチダ和漢薬	疎経活血湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠
散痛楽楽丸	イスクラ産業	ソケーカンS「コタロー」	小太郎漢方製薬
JPS疎経活血湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬	痛絡丸	松浦薬業
疎経活血湯エキス顆粒OM	大峰堂薬品工業	風濕舒筋丸	ハツ目製薬
疎経活血湯エキス細粒〔勝昌〕	東洋薬行	モリ ハイツウン	大杉製薬
疎経活血湯エキス錠クラシエ	クラシエ薬品		

使用上の注意（平成 25 年 10 月現在）

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

当帰、地黄、川芎、蒼朮または白朮、茯苓、桃仁、芍薬、牛膝、威靈仙、防己、羌活、防風、竜胆、生姜、陳皮、白芷、甘草

疎経活血湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	1	2	1	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない